



Effect van cognitieve gedragstherapie op depressie



Effect van cognitieve gedragstherapie op kwaliteit van leven



Tabel 3. Meta-analyse en GRADE cognitieve gedragstherapie versus controlegroepen

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met controle	Risico met CGT				
Depressie score	-	SMD 1,10 lager (1,80 lager tot 0,40 lager)	-	37 (1)	LAAG ^a	Cognitieve gedragstherapie lijkt te resulteren in een grote vermindering van depressie bij patiënten in de palliatieve fase.
Kwaliteit van leven	-	SMD 0,00 (0,65 lager tot 0,65 hoger)	-	37 (1)	LAAG ^a	Cognitieve gedragstherapie lijkt niet te resulteren in een verschil in kwaliteit van leven bij patiënten in de palliatieve fase

a. onnauwkeurigheid (2x)

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten.

Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)