

Indicatie	Middelen	Niet-orale toedieningsweg
<b>Pijn</b>		
<b>Onderhoudsbehandeling</b>	Paracetamol  Morfine Oxycodon Hydromorfon Fentanyl Buprenorfine	Rectaal  Intermitterend of continu s.c. of i.v. Intermitterend of continu s.c. of i.v. Intermitterend of continu s.c. of i.v. Transdermaal (pleister) Sublinguaal, transdermaal (pleister)
<b>Doorbraakpijn</b>	Morfine Oxycodon Hydromorfon  Fentanyl	Rectaal, s.c. of i.v. S.c. of i.v. S.c. of i.v.  Sublinguaal, buccaal, intranasaal
<b>Misselijkheid en braken</b>	Metoclopramide Haloperidol Levomepromazine	Rectaal, s.c. of i.v. Buccaal, s.c. of i.v. Buccaal, s.c. of i.v.
<b>Obstipatie</b>	Bisacodyl Natriumlaurylsulfoacetaat Fosfaatklysma Methylnaltrexon	Rectaal Rectaal Rectaal S.c.
<b>Slaapproblemen, angst en sedatie</b>	Temazepam Midazolam Lorazepam Diazepam Clonazepam Levomepromazine	Rectaal (capsule) Intranasaal, buccaal of s.c. Sublinguaal, s.c. of i.v. Rectaal of i.v. Sublinguaal, buccaal, s.c. of i.v. (druppels) Buccaal, s.c. of i.v.
<b>Hersentumoren/ -metastasen</b>	Dexamethason Levetiracetam Clonazepam	S.c. of i.v. S.c. (continu) of i.v. Sublinguaal, buccaal, s.c. of i.v. (druppels)
<b>Couperen insulten</b>	Midazolam	Intranasaal, buccaal of s.c.
<b>Parkinson</b>	[Richtlijn Parkinson].	

Tabel 2. Medicatie in de stervensfase