

**Tabel 2 meta-analyse en GRADE bereavement groepen bij rouw**

(Let op! Bij het presenteren van de effecten is gebruik gemaakt van de gegevens uit het artikel, zie laatste kolom voor interpretatie)

Uitkomsten	Absolute effecten <sup>a</sup> (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met [comparison]	Risico met bereavement groepen				
Rouw na behandeling follow up: gemiddeld 10 weken	-		SMD 0.16 hoger (0.03 lager tot 0.36 hoger)	532 (6 RCT's)	⊕⊕⊕○ REDELIJK <sup>a</sup>	Rouw lotgenoten groepen verminderen gevoelens van rouw waarschijnlijk niet.
Depressie na behandeling follow up: gemiddeld 10 weken	-		SMD 0.14 hoger (0.11 lager tot 0.38 hoger)	310 (4 RCT's)	⊕⊕⊕○ REDELIJK <sup>a</sup>	Rouw lotgenoten groepen verminderen depressieve symptomen waarschijnlijk niet.

a. Het betrouwbaarheidsinterval valt ook in het klinisch relevant gebied (in het voordeel van de interventie)