



## Effect van muziektherapie op depressie



## Effect van muziektherapie op kwaliteit van leven



Tabel 10. Meta-analyse en GRADE muziektherapie versus controlegroepen

| Uitkomsten          | Absolute effecten* (95% CI) |  | Relatief effect (95% CI) | Aantal deelnemers (studies) | Certainty of the evidence (GRADE) | Opmerkingen   |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|                     | Risico met controle         | Risico met muziektherapie                  |                          |                             |                                   |   |
| Depressie score     | -                           | SMD 1,08 lager (1,64 lager tot 0,53 lager) | -                        | 227 (4)                     | ⊕○○○<br>ZEER LAAG <sup>a,b</sup>  | Muziektherapie lijkt depressie te verminderen bij patiënten in de palliatieve fase, maar het bewijs is zeer onzeker |
| Kwaliteit van leven | -                           | SMD 0,61 lager (0,82 lager tot 0,41 lager) | -                        | 421 (5)                     | ⊕⊕○○<br>LAAG <sup>a,c</sup>       | Muziektherapie lijkt kwaliteit van leven bij patiënten in de palliatieve fase te verhogen                           |

a. Risico op vertekening (2x)

b. Onnauwkeurigheid

c. Risico op vertekening

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten.

Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)