

**Tabel 4. TCA versus placebo voor depressie in de palliatieve fase (respons)**

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)
	Respons met placebo	Respons met medicamenteuze behandeling			
Depressie (Respons 4-5 weken)	191 per 1.000	Niet vermeld	<b>OR 4,79</b> (1,86 tot 12,37)	95 (3 RCTs)	⊕○○○ ZEER LAAG <sup>a,b,c</sup>
Depressie (Respons 6-8 weken)	237 per 1.000	Niet vermeld	<b>OR 3,48</b> (1,32 tot 9,18)	191 (4 RCTs)	⊕○○○ ZEER LAAG <sup>a,b,c</sup>
Depressie (Respons 9-18 weken)	175 per 1.000	Niet vermeld	<b>OR 6,00</b> (1,25 tot 28,84)	74 (2 RCTs)	⊕○○○ ZEER LAAG <sup>a,b,c</sup>

a. Risico op vertekening bij individuele studies onbekend, over het algemeen is de kwaliteit laag

b. De funnelplot in de paper van Rayner liet een asymmetrische verdeling zien, met relatief weinig studies links onderin, duidend op publicatiebias

c. De populatie in de RCTs weerspiegelt onvoldoende de palliatieve populatie waarvoor de richtlijn bedoeld is.