


Effect van CALM op depressie



Tabel 9. Meta-analyse en GRADE CALM versus controlegroepen

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met controle	Risico met CALM				
Depressie score	-	SMD 0,27 lager (0,51 lager tot 0,03 lager)	-	275 (2)	⊕⊕⊕⊕ LAAG ^{a,b}	CALM lijkt te resulteren in enige vermindering van depressie bij patiënten in de palliatieve fase.
Depressie score	-	SMD 0,06 hoger (0,29 lager tot 0,42 hoger)	-	125 (1)	⊕⊕⊕⊕ LAAG ^c	CALM lijkt in vergelijking met ondersteunende psycho-oncologisch begeleiding niet te resulteren in een vermindering van depressie bij patiënten in de palliatieve fase
Kwaliteit van leven	-	SMD 0,34 lager (0,70 lager tot 0,02 hoger)	-	125 (1)	⊕⊕⊕⊕ LAAG ^c	CALM lijkt in vergelijking met ondersteunende psycho-oncologische begeleiding te resulteren in enige toename van kwaliteit van leven bij patiënten in de palliatieve fase.

a. Risico op vertekening

b. Onnauwkeurigheid

c. Onnauwkeurigheid (2)

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten.

Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)